



الجامعة العربية الأمريكية والاحصاء الفلسطيني يعلنان نتائج "مسح الامصال الخاص بفيروس كورونا"

75.9% من الفلسطينيين في الضفة الغربية ممن هم فوق 18 عاما طوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا وذلك وفق دراسة نفذت بالتعاون ما بين مركز الدراسات واستطلاع الرأي في الجامعة العربية الأمريكية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

تبعا للدراسات التي قامت بها الجامعة العربية الأمريكية لمواكبة التغيرات المتتسارعة في الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وتعزيزا لأهمية دراسة الوضع الوبائي الحالي في فلسطين، قام مركز الدراسات واستطلاع الرأي بالجامعة الأمريكية وبالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء بتنفيذ مسح ميداني رافقه مسح لأمصال لعينة عشوائية من الفلسطينيين البالغين بهدف تحديد نسبة الأشخاص من المجتمع الذين طوروا أجسام مضادة لفيروس كورونا وقراءة المؤشرات الصحية لدراسة الخارطة الوبائية في محافظات الضفة الغربية.

قام الفريق البحثي بجمع البيانات خلال الفترة الممتدة بين (2021/9/14-2021/10/21) من عينة عشوائية ضمت 1,451 شخص موزعين على 11 محافظة في الضفة الغربية وممن هم فوق 18 عاما ، وتم اجراء فحوصات الأمصال باستخدام تقنيات حديثة في مختبرات الجامعة الأمريكية الأمريكية ل 911 عينة دم للأفراد الذين لم يمانعوا المشاركة بفحص الأمصال. وقد إحتوت الإستماره التي قام باستيفائها 1451 فلسطينيا على العديد من المؤشرات الديمغرافية والصحية منها على سبيل المثال لا الحصر، جنس المبحوث، العمر، الحاله الصحيه من حيث الإصابه بالأمراض غير المعديه مثل السكري، الضغط الخ.




الجامعة العربية الأمريكية

الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني

بيّنت نتائج فحوصات مسح الأمسال أن 75.9 % من الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية ممن هم فوق 18 عاما طوروا أجساما مضادة ضد فيروس كورونا وبنسب مقاربة بين الذكور (77.5%) والإناث (74.2%).

نسبة الأفراد 18 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب وجود أجسام مضادة للفيروس والجنس



وأظهرت نتائج الدراسة فروقات ملحوظة في تطوير الأجسام المضادة بين الفئات العمرية المختلفة. حيث تبين أن 69.2 % من الفئة العمرية 18-29 طوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا ،




الجامعة العربية الأمريكية

الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني

مقارنة بـ 77.9 % من الفئة العمرية 30 - 49 و 84.1 % بين الأشخاص الذين أعمارهم 50 فما فوق.

نسبة الأفراد 18 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب وجود أجسام مضادة للفيروس والعمر




وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 94.5 % من بين الذين تلقوا اللقاح طوروا أجساما مضادة وأما الذين لم يتلقوا اللقاح فان 53.6 % منهم طوروا أجساما مضادة وذلك بسبب الإصابة بالفيروس



الجامعة العربية الأمريكية

الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني

نسبة الأفراد 18 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب وجود أجسام مضادة للفيروس وتلقي اللقاح



وأفاد 13.6% من المبحوثين أنهم تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، حيث تفاوتت النسب بشكل ملموس بين الإناث (16.5%) و الذكور (10.7%).




الجامعة العربية الأمريكية

الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني

لقد صرّح 52.8% من المبحوثين أنهم تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بنسب متفاوتة بين الذكور (64.3%) والإناث (40.9%).

وأظهرت النتائج أن 51.8% من الذين تلقوا اللقاحات تلقوا لقاح فايزر، 27.1% منهم تلقى لقاح سبوتنيك لait ونسبة الأقل تلقوا اللقاحات الأخرى المتوفرة.

نسبة الأفراد 18 سنة فأكثر الذين تلقوا مطعوم ضد فيروس كورونا في الضفة الغربية حسب نوع المطعوم





تسهم نتائج هذه الدراسة في توضيح الصورة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، وتستمر الجامعة العربية الأمريكية وبالتعاون مع العديد من المؤسسات في الوطن بتتبع انتشار الفيروس و دراسة الخارطة الوبائية في فلسطين. وبهدف مركز الدراسات و إستطلاع الرأي في الجامعه الأمريكية إلى تنفيذ أبحاث ودراسات نوعية يمكنها المساعدة في دعم صناعة القرار المبنية على البيانات في القطاعات العام، والخاص والأهلي.