





التوزيع النسبي لأعضاء المجلس التشريعي في الأراضي الفلسطينية حسب الجنس، 2006  
Percentage Distribution of Legislative Council Members in the Palestinian Territory by Sex, 2006




12.9% of Legislative Council Members are Women. 12.9% من أعضاء المجلس التشريعي هم من النساء.

التوزيع النسبي للإناث (15 سنة فأكثر) اللواتي سبق لهن الزواج حسب الحالة التعليمية، 2005  
Percentage Distribution of Ever-Married Females (15 Years and over), by Education Attainment, 2005



15.4% of Ever-Married Women are Illiterate, Compared with 10.2% have Associate Diploma and Above.

التوزيع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن الزواج حسب أكثر المهنة استقطاباً، 2005  
Percentage Distribution of Ever-Married Women by The Major Employing Profession, 2005



About Third of Ever-Married Women Work as Professionals and Clerks حوالي ثلث النساء اللواتي سبق لهن الزواج يعملن فتيات ومتخصصات وكتبة.

نسبة المشاركة ومعدل البطالة في القوى العاملة للإناث (15 سنة فأكثر) اللواتي سبق لهن الزواج حسب المنطقة ونوع التجمع، 2005  
Participation Rate and Unemployment Rate in Labour Force of Ever-Married Females (15 Years and over), by Region and Type of Locality, 2005

Region and Type of Locality	Unemployment Rate	Participation Rate
<b>المنطقة</b>		
Palestinian Territory	14.9	9.4
West Bank	21.3	11.4
Gaza Strip	13.3	5.6
<b>نوع التجمع</b>		
Urban	17.6	10.2
Rural	6.7	10.7
Camps	25.7	4.8

حوالي ربع النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المخيمات ومشاركات في القوى العاملة لا يعملن ويبحثن عن عمل (عاطلات عن العمل) About Quarter of Ever-Married Women in Camps and Participation in Labour Force are Unemployed.

نسبة المواليد (آخر مولودين) خلال السنوات 2001-2003 والذين تعرضت أمهاتهم إلى مشاكل صحية حسب المشكلة الصحية وبعض الخصائص الخلفية  
Percentage of Births (Last Two) During 2001-2003 Whose Mothers Had Certain Health Problems, by Health Problem and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	المشاكل الصحية						الخصائص الخلفية
	تورم (Edema)	صداع حاد (Headache)	فقر دم (Anemia)	التهابات في الجهاز التناسلي (Reproductive Tract Infection)	الزيف المهبلي (Vaginal Bleeding)	التهاب المسالك البولية (Urinary Tract Infection)	
<b>المنطقة</b>							
Palestinian Territory	18.3	20.3	21.1	14.1	9.7	25.2	الأراضي الفلسطينية
West Bank	21.1	19.5	19.8	16.3	12.7	30.2	الضفة الغربية
Gaza Strip	14.5	21.3	22.7	11.4	5.5	18.3	قطاع غزة
<b>نوع التجمع</b>							
Urban	18.1	19.2	21.0	14.4	9.3	25.1	حضر
Rural	20.8	19.7	19.8	14.5	11.2	28.8	ريف
Camps	14.9	24.8	23.5	12.6	8.6	19.7	مخيمات
<b>تعليم الأم</b>							
None	20.3	28.4	26.6	11.6	11.3	32.9	لا شيء
Elementary	18.4	24.2	22.3	12.9	8.7	24.8	ابتدائي
Preparatory	18.4	19.5	21.4	15.5	9.3	24.4	إعدادي
Secondary and Above	17.3	16.9	18.6	13.3	10.5	24.4	ثانوي فأعلى

التهاب المسالك البولية أكثر المضاعفات انتشاراً أثناء الحمل، فقد تعرضن ربع النساء (25.2%) إلى ذلك، يليها فقر الدم (21.1%) Urinary Tract Infections was the Most Common Complication of Pregnancy About 25.2% of Women Surveyed Reported that, Followed by Anemia at 21.1%

نسبة المواليد (آخر مولودين) الذين تمت ولادتهم في مستشفيات خلال السنوات 2001-2003 والذين تلقى أمهاتهم تلقيحاً صحياً حسب موضوع التلقيح وبعض الخصائص الخلفية  
Percentage of Births (Last Two) Born at Hospitals During 2001-2003 Whose Mothers Received Health Education, by Subject of Health Education and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	نسبة اللواتي حصلن على تلقيح صحي (Percentage of Receiving Health Education)	موضوع التلقيح الصحي					الخصائص الخلفية
		الرضاعة الطبيعية (Breast-Feeding)	تغذية الأم (Nutrition of Mother)	تنظيم الأسرة (Family Planning)	التلقيح (Immunization)	أهمية المتابعة (Importance of Follow up)	
<b>المنطقة</b>							
Palestinian Territory	44.9	42.3	33.0	27.7	44.4	32.9	الأراضي الفلسطينية
West Bank	54.7	47.6	36.9	31.2	59.8	39.2	الضفة الغربية
Gaza Strip	31.4	34.5	27.2	22.4	24.0	24.2	قطاع غزة
<b>تعليم الأم</b>							
None	39.3	37.0	25.8	25.5	42.9	29.6	لا شيء
Elementary	45.0	41.1	30.0	26.3	42.2	30.0	ابتدائي
Preparatory	45.0	41.1	33.3	27.8	46.3	33.5	إعدادي
Secondary and Above	45.4	44.6	35.0	28.5	43.5	34.6	ثانوي فأعلى


يلاحظ انخفاض نسبة الحصول على تلقيح صحي مع انخفاض مستويات التعليم بين النساء اللواتي تمت مقابلتهن، 60.7% من النساء غير المتعلقات أفدن بأنهن لم يحصلن أبداً على أي تلقيح صحي، بينما 54.6% من النساء اللواتي يحملن مؤهل ثانوي فأعلى أفدن بأنهن لم يحصلن على تلقيح صحي. Percentage of Receiving of Health Education Decreased with Level of Education Among the Surveyed Women: 60.7% of the Non-Educated Women Reported that they had Never Received Health Education, While 54.6% of Women have Secondary and Above Indicated that they had Never Received Health Education

التوزيع النسبي للنساء (20-54 سنة) حسب القيام بالفحص اليدوي للصدر والمنطقة ونوع التجمع وعدد مرات الفحص، 2004  
Percentage Distribution of Women Aged 20-54 Years by Indication Self/Manual Breast Exam, Region, Type of Locality and Frequency of Test, 2004

Region and Type of Locality	القيام بالفحص اليدوي للصدر				المنطقة ونوع التجمع
	لا تفحص (Do not Exam)	غير ذلك (Other)	مرة كل بضعة شهور (Once Every Few Months)	مرة شهرياً (Once Monthly)	
<b>المنطقة</b>					
Palestinian Territory	70.9	3.5	15.9	9.7	الأراضي الفلسطينية
West Bank	72.9	4.1	13.9	9.1	الضفة الغربية
Gaza Strip	67.2	2.4	19.4	11.0	قطاع غزة
<b>نوع التجمع</b>					
Urban	69.8	3.2	16.8	10.2	حضر
Rural	77.1	4.2	11.0	7.7	ريف
Camps	64.2	3.3	20.9	11.6	مخيمات

أكثر من ثلثي النساء في الأراضي الفلسطينية لم يقمن بالفحص اليدوي للصدر في عام 2004 More than Two Thirds of Women in the Palestinian Territory Did not Indicated Self/ Manual Breast Exam in 2004

نسبة النساء (20-54 سنة) اللواتي قمن بفحص عنق الرحم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات حسب المنطقة ونوع التجمع، 2004  
Percentage of Women Aged 20-54 Years Who Indicated Having Had Pap Smear Testing at Least Once Every Three Years by Region and Type of Locality, 2004




النساء في المخيمات تقوم بفحص عنق الرحم بشكل أكبر من نساء الحضر والريف، ونساء قطاع غزة تقوم بالفحص بشكل أكبر من نساء الضفة الغربية. Women in Camps have had Pap Smear Test More than Rural and Urban Women and the Women in Gaza Strip More than those in the West Bank.

التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً (15-49 سنة) حسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة وبعض الخصائص الخلفية، 2004  
Percentage of Currently Married Women Aged 15-49 Years Who are Using (or Whose Partner is Using) a Contraceptive Method, by Selected Background Characteristics, 2004

Background Characteristics	استخدام وسائل تنظيم الأسرة					الخصائص الخلفية
	لا تستخدم (No Method)	أي وسيلة حديثة (Any Modern Method)	أي وسيلة تقليدية (Any Traditional Method)	الحبوب (Pills)	اللولب (IUD)	
<b>المنطقة</b>						
Palestinian Territory	49.4	37.3	13.3	6.2	23.7	الأراضي الفلسطينية
West Bank	44.9	40.5	14.5	6.1	28.1	الضفة الغربية
Gaza Strip	57.0	31.9	11.1	6.4	16.2	قطاع غزة
<b>نوع التجمع</b>						
Urban	50.0	37.2	12.8	6.6	23.1	حضر
Rural	44.7	38.3	17.0	5.4	27.4	ريف
Camps	55.3	36.0	8.6	6.3	19.2	مخيمات
<b>العمر</b>						
Less than 20	84.9	8.1	7.0	2.2	4.6	أقل من 20
20-24	63.8	24.1	12.1	5.7	14.9	20-24
25-29	43.6	42.4	14.0	6.6	27.0	25-29
<b>المؤهل العلمي</b>						
None	54.9	37.5	7.6	5.1	21.6	لا شيء
Elementary	49.0	39.3	11.7	6.4	23.6	ابتدائي
Preparatory	49.1	37.5	13.4	5.8	25.5	إعدادي
Secondary	50.7	35.7	13.6	7.2	21.4	ثانوي
Associate Diploma and Above	43.3	36.3	20.4	6.3	24.2	دبلوم متوسط فأعلى

50.6% من النساء المتزوجات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، منهن 13.3% يستخدمن الوسائل التقليدية. 50.6% of Married Women are using any Contraceptive Method, of which 13.3% are using any Traditional Method.

التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) خلال السنوات 2001-2003 والذين تلقى أمهاتهم رعاية أثناء الحمل حسب مكان تلقي الرعاية والمنطقة  
Percentage Distribution of Births (Last Two) During 2001-2003 Whose Mothers Received Antenatal Care by Place of Antenatal Care and Region, 2004



أكثر الأماكن التي تذهب إليها الأم للحصول على الرعاية الصحية أثناء الحمل في الضفة الغربية هي عيادة الطبيب (50.3%) بينما في قطاع غزة شكلت عيادات وكالة العون الدولية لتشغيل اللاجئين مصدراً رئيسياً (60.7%) In the West Bank the Physicians' Clinics were the Most Frequently Mentioned Source of Antenatal Care (Used by 50.3% of Surveyed Women), While in Gaza Strip UNRWA Clinic at (60.7%)